

Aktuelles

- W-weizen:** Frühe Bestände stehen im BBCH 32. Die für diese Jahreszeit viel zu kühlen Temperaturen haben das Wachstum gebremst und zu verstärkten Stresserscheinungen geführt. Dies zeigt sich vor allem durch vergilbte und abgestorbene Blätter, sowie gelbe Blattspitzen. Der Krankheitsdruck ist derzeit gering. In anfälligen Sorten ist teilweise Septoria tritici, Gelbrost und Stängelmehltau vorhanden. Die gefallenen Niederschläge erhöhen den Infektionsdruck.
- Z.-rüben:** Die Zuckerrüben scheinen die Nachfröste überwunden zu haben und befinden sich im BBCH-Stadium 10-14. Wenn die Temperaturen ansteigen, kommen auch die Unkräuter. Wenn noch nicht geschehen die 1. NAK durchführen.
- W.-Raps:** Der frühe Raps geht in den nächsten Tagen in die Vollblüte und erreicht somit den optimalen Termin der Blütenbehandlung. Die Infektionsbedingungen für Sklerotinia waren in den vergangenen Tagen eher ungünstig. Temperaturen zwischen 10-15°C und Niederschläge begünstigen den Pilz. Anders als in den vergangenen Jahren ist in diesem Jahr mit einer langen Blüte zu rechnen, dementsprechend erhöht sich das Risiko einer Infektion, vor allem in engen Rapsfruchtfolgen. Siehe LHW-Mitteilung Nr. 5.

Fungizid und Wachstumsregulierung Wintergerste

Die Wintergerste beginnt das Fahnenblatt zu schieben und steht vor dem Grannenspitzen, deshalb ist die Abschlussbehandlung in Kombination mit einer Nachkürzung in üppigen Beständen einzuplanen. Um einen ausreichend langen Fungizidschutz zu gewährleisten, sollten die Aufwandmengen nicht zu niedrig ausfallen. Ist keine Nachkürzung vorgesehen oder nicht notwendig, kann die Fungizidbehandlung in das Ährenschieben hinausgezögert werden. Außerdem ist zu beachten, dass der Wirkstoff Chlortalonil (Amistar Opti, Credo) vorbeugend gegen einen späten Ramulariabefall eingesetzt wird. Beim Einsatz von Camposan Extra / Cerone 660 ist folgendes zu beachten:

- Camposan Extra / Cerone 660 (0,2-0,4 l/ha) nur bis zum Grannenspitzen (ES 49) einsetzen.
- Camposan Extra / Cerone 660 immer zuletzt einmischen.
- Keine Mischungen von Camposan Extra / Cerone 660 mit Herbiziden sowie Getreidemix Blatt.
- Kein Einsatz von Camposan Extra / Cerone 660 bei Nachtfrostgefahr.

Empfehlung Fungizid und Wachstumsregler Wintergerste


Adexar 1,0 + Amistar Opti 1,2 (Gew.: 90% 5m) 73 €
Aviator Xpro 0,8 + Amistar Opti 1,2 (Gew.: 90% 5m) 74 €
Elatus Era 0,8 + Amistar Opti 1,2 (Gew.: 90% 5m) 76 €
Gewässer: **Aviator 1,0 (Gew.: 75% 1m)** 68 €

Zwergrost, Rhynchosporium,
Netzflecken, Ramularia

+

Einsatz bis spätestens
Grannenspitzen **BBCH 49**

Camposan Extra (Gew.: 50% 1m)
0,2 - 0,4 7 - 14 €



Hans-Martin Ludewig: 05126 801-25; 0170 452 1611 Harald Mundt: 05126 801-24; 0163 801 0618

Alle Angaben ohne Gewähr! Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.

Bei allen Pflanzenschutzmaßnahmen sind die Gebrauchsanweisungen und die gesetzlichen Vorgaben zu beachten!
Landhandel Weiterer GmbH, Speicherstr. 3, 31191 Algermissen, 05126 801-0, info@weiterer.de, www.weiterer.de