

Aktuelles

- W.-weizen:** Weizen schiebt das Fahnenblatt oder hat bereits das Fahnenblattstadium erreicht. Die Krankheitssituation ist moderat. In anfälligen Sorten (Tobak, Matrix, Asano, Benchmark, Rumor) ist teilweise Gelbrost vorhanden. Septoria tritici spielt zur Zeit keine große Rolle. Nachbehandlungen gegen Unkräuter noch vor dem Ährenschieben durchführen. Schädlinge sind noch nicht bekämpfungswürdig.
- W.-gerste:** Die Gerste beginnt, bzw. ist mitten im Ährenschieben. Fungizidmaßnahmen sollten Mitte des Ährenschiebens durchgeführt werden, damit das Fahnenblatt noch ausreichend benetzt wird. Nachkürzung ins Ährenschieben nicht mehr durchführen.
- Z.-rüben:** Entwickeln sich zügig. Herbizidmaßnahmen waren gut verträglich.
- Mais:** Herbizidmaßnahmen einplanen, bzw. durchführen.

Pamira 2017

Algermissen	13.06.2017 – 16.06.2017	7.30 – 16.00 Uhr
Opperhausen	26.06.2017 – 28.06.2017	7.30 – 16.30 Uhr
Hedemünden	03.07.2017	7.30 – 16.00 Uhr
Weitere Stellen:	http://pamira/pamira-system.html	

Fungizid Winterweizen (EC 39)

Früh bestellter Winterweizen beginnt das Fahnenblatt (EC 37) zu schieben oder hat es bereits geschoben. Da der Gelbrost weiterhin die dominierende Krankheit ist, sollten zur anstehenden Fahnenblattbehandlung carboxamidhaltige Fungizidkombinationen eingesetzt werden. Um die Dauerwirkung dieser Kombinationen effektiv zu nutzen, muss das Fahnenblatt voll entwickelt sein, damit möglichst viel Assimilationsfläche benetzt wird und ein ausreichender Schutz bis zur Ährenbehandlung besteht. In üppig entwickelten Beständen kann zur Nachkürzung Medax Top + Turbo zugesetzt werden, um die letzten Internodien einzukürzen und die Halmwand zu verstärken. Wachstumsregler und Herbizide sollten bei beginnendem Ährenschieben nicht mehr eingesetzt werden, um Kulturschäden zu vermeiden. Nachfolgend sind mögliche Fungizidkombinationen aufgeführt.

Empfehlung Fungizid (Fahnenblatt BBCH 39)

Septoria tritici, DTR,
Gelbrost, Braunrost

Nur im
Pack


Aviator Xpro 0,4 + Fandango 0,4 (Gew.: 90% 1m)	47 €
Adexar 1,0 (Gew.: 75% 1m)	47 €
Aviator Xpro 0,75 (Gew.: 90% 1m)	51 €
Elatus Era 0,6 + Sympara 0,2 (Gew.: 90% 5m)	49 €
Champion 0,5 + Diamant 0,5 (Gew.: 90% 1m)	42 €

+

Zusatz möglich (bis EC 39) bei:

- lageranfälligen Sorten,
- guter Wasserversorgung,
- hoher N-Nachlieferung,
- langjähriger org. Düngung

Medax Top + Turbo (Gew.: 50% 1m)
0,3 - 0,5 + 0,3 - 0,5 10 - 17 €




Empfehlung Fungizid (Abschlussbehandlung BBCH 47/51)

Septoria tritici, DTR,
Gelbrost, Braunrost

Nur im
Pack

Aviator Xpro 0,5 + Fandango 0,5 (Gew.: 90% 1m)	59 €
Adexar 1,2 (Gew.: 75% 1m)	57 €
Aviator Xpro 0,9 (Gew.: 90% 1m)	61 €
Elatus Era 0,75 + Sympara 0,25 (Gew.: 90% 5m)	61 €
Champion 0,7 + Diamant 0,7 (Gew.: 90% 1m)	59 €



Hans-Martin Ludewig: 05126 801-25; 0170 452 1611 Harald Mundt: 05126 801-24; 0163 801 0618


Alle Angaben ohne Gewähr! Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.

Bei allen Pflanzenschutzmaßnahmen sind die Gebrauchsanweisungen und die gesetzlichen Vorgaben zu beachten!
Landhandel Weiterer GmbH, Speicherstr. 3, 31191 Algermissen, 05126 801-0, info@weiterer.de, www.weiterer.de

Insektizid Winterweizen

Der Befall mit **Blattläusen** und **Sattelmücken** hält sich zur Zeit in Grenzen. Kontrollen bis zum Ährenschieben sind trotzdem angeraten, da auch im Frühjahr das Gelbverzwergungsvirus durch beladene Blattläuse übertragen werden kann. Bei einer Infektion kommt es zwar nicht zu der typischen Verzweigung, sondern zu einer Verstopfung der Leitbahnen. Diese führt zu einer Abschnürung der Ähre mit Wasser und Nährstoffen und die Ähre stirbt vorzeitig ab. **Getreidehähnchen** sind vereinzelt vorhanden, aber noch nicht bekämpfungswürdig. Um den Nützlingen eine Chance zu lassen und die Resistenzen zu vermeiden, sollten die unten aufgeführten Schadschwellen eingehalten werden. Sind diese überschritten kann ein Insektizid zur Fungizidmaßnahme zugesetzt werden.

Empfehlung Insektizid



* alternativ: Bulldock 300 ml/ha (7 €/ha); Karate Zeon 75 ml/ha (11 €/ha)

Herbizid Mais

Die Maisaussaat ist abgeschlossen, so dass die Unkraut- und Ungrasbekämpfung ansteht. Bei der Unkrautbekämpfungsstrategie sind mehrere Faktoren zu unterscheiden, mit oder ohne Hirse und moderate Verunkrautung oder starke Verunkrautung, sowie die Witterung vor und nach der Applikation. Ebenfalls ist zwischen einer Einfachbehandlung und einer Doppelbehandlung zu unterscheiden.

Einfachbehandlung:

- Zügiger Reihenschluss (Beschattung)
- Leicht bekämpfbare Verunkrautung (Gänsefuß, Vogelmiere, Stiefmütterchen)
- Behandlungen im 4-Blattstadium ohne Wetterkapriolen und ausreichend Feuchtigkeit

Doppelbehandlung:

- Frühe Aussaat und zögerlicher Reihenschluss
- Humusreiche Standorte
- Großer Besatz an Storchschnabel und Hirsearten
- Erste Behandlung im 1 – 3-Blattstadium, Nachbehandlung im 5 – 6-Blattstadium

Nachbehandlungen sollten bis zum 6-Blattstadium abgeschlossen sein, da der Mais ab diesem Stadium z.B. Kolbenreihen, die Körner je Reihe usw. anlegt. Weiterhin verändert sich die Struktur der Wachsschicht, so dass der Mais mehr Wirkstoff aufnimmt und es zu Kulturschäden kommen kann. Alle Nicosulfuron-haltigen Präparate (z.B. Motivell Forte, Kelvin, Nicogan) besitzen die Auflage NG 327, d. h. kein Einsatz im folgenden Jahr auf derselben Fläche. Allgemein ist von Anwendungen nach Niederschlägen, bei hohen Temperaturschwankungen und Nachtfrostgefahr abzuraten. In der nachfolgenden Empfehlung können alle Mittel mit 90 % Abdriftminderung bis auf 1 m an Gewässer appliziert werden.


Einfachbehandlung moderate Verunkrautung

Gänsefuß, Knöterich, Stiefmütterchen, Klettenlabkraut, Kamille, u. a.

Calaris 1,0 - 1,25 47 - 59 €
[+ Bromotril 0,3 ca. 6 €]

Bromoterb* 1,5 - 2,0 32 - 42 €

Zusatz bei:
etwas Hirsen, Afu, Ausfallgetreide
Motivell forte 0,5 16 €
Cato 0,025 + FHS 0,15 28 €



BBCH-Code	00	11	12	13	14	15	17-32
	<i>Saat</i>	<i>1. Laubblatt entfaltet</i>	<i>2. Laubblatt entfaltet</i>	<i>3. Laubblatt entfaltet</i>	<i>4. Laubblatt entfaltet</i>	<i>5. Laubblatt entfaltet</i>	<i>7. Laubblatt entfaltet/ 2. Stängelknoten</i>

Hans-Martin Ludewig: 05126 801-25; 0170 452 1611 Harald Mundt: 05126 801-24; 0163 801 0618

Alle Angaben ohne Gewähr! Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.
Bei allen Pflanzenschutzmaßnahmen sind die Gebrauchsanweisungen und die gesetzlichen Vorgaben zu beachten!
Landhandel Weiterer GmbH, Speicherstr. 3, 31191 Algermissen, 05126 801-0, info@weiterer.de, www.weiterer.de

Einfachbehandlung Verunkrautung mit Hirsen

Hirsen und Gräser, Gänsefuß, Knöterich, Nachtschatten, Klettenlabkraut, Kamille, u. a.

MaisTer Power Aspect Pack*	MaisTer Power 1,25 + Aspect 1,25	77 €	Hühner-, Borstenhirse, Ackerfuchsschwanz
Elumis Extra Pack	Elumis 1,0 + Gardo Gold 3,0	82 €	Hühner-, Borstenhirse, Ackerfuchsschwanz, Einj. Risse
Laudis Aspect Pack*	Laudis 2,0 + Aspect 1,5	87 €	Hühner-, Borstenhirse, Ackerfuchsschwanz
Zintan Platin Plus Pack	Calaris 1,25 + Dual Gold 1,0 + Peak 15 g	84 €	Hühner-, etwas Borstenhirse



*Rübenachbau möglich

BBCH-Code	00	11	12	13	14	15	17-32
	Saat	1. Laubblatt entfaltet	2. Laubblatt entfaltet	3. Laubblatt entfaltet	4. Laubblatt entfaltet	5. Laubblatt entfaltet	7. Laubblatt entfaltet/ 2. Stängelknoten

Zweifachbehandlung starke Verunkrautung

Hühner- und Borstenhirse, Gänsefuß, Knöterich, Nachtschatten, Klettenlabkraut, Kamille, u. a.

Vorlage BBCH 12-14

Nachlage BBCH 15-16


Laudis Aspect Pack*	Laudis Aspect Pack* Laudis 1,5 + Aspect 1,2	67 €	Motivell forte* 0,5	14 €	Hühner-, Borstenhirse
			Callisto 0,5 + Buctril 0,3	31 €	Hühnerhirse, Nachtschatten, Knöterich

Hühnerhirse, etwas Borstenhirse, Gänsefuß, Knöterich, Nachtschatten, Klettenlabkraut, Kamille, u. a.

Vorlage BBCH 12-14

Nachlage BBCH 15-16

Zintan Platin Plus Pack	Zintan Platin Plus Pack Calaris 0,8 + Dual Gold 0,7 + Peak 10 g	56 €	Motivell forte* 0,5	14 €	Hühner-, Borstenhirse
			Callisto* 0,5 + Buctril 0,3	31 €	Hühnerhirse, Nachtschatten, Knöterich



*Rübenachbau möglich

BBCH-Code	00	11	12	13	14	15	17-32
	Saat	1. Laubblatt entfaltet	2. Laubblatt entfaltet	3. Laubblatt entfaltet	4. Laubblatt entfaltet	5. Laubblatt entfaltet	7. Laubblatt entfaltet/ 2. Stängelknoten

Hans-Martin Ludewig: 05126 801-25; 0170 452 1611 Harald Mundt: 05126 801-24; 0163 801 0618

Alle Angaben ohne Gewähr! Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.

Bei allen Pflanzenschutzmaßnahmen sind die Gebrauchsanweisungen und die gesetzlichen Vorgaben zu beachten!

Landhandel Weiterer GmbH, Speicherstr. 3, 31191 Algermissen, 05126 801-0, info@weiterer.de, www.weiterer.de

Problemunkräuter Mais

Acker-/ Zaunwinde	0,5 kg/ha Mais Banvel WG od. 0,2 kg/ha Arrat + 1,0 l/ha Dash bei 15-20cm Triebblänge der Winde in solo Anwendung.
Ampfer (Arten)	0,2 kg/ha Arrat + 1,0 l/ha Dash
Quecke	Cato + FHS 0,035-0,05 kg/ha oder 0,75 Motivell Forte
Ackerkratzdistel	0,35 l/ha Effigo oder 1,2 l/ha Vivendi 100
Landwasserrknöterich	0,2 kg/ha Arrat + 1,0 l/ha Dash unterdrückende Wirkung